**Lösungsvorschläge zu den Übungsaufgaben
der Wahlpflichtvorlesung Reaktionskinetik SS 2013**
ohne Gewähr

Blatt 2

Aufgabe 5

$$\int_{[A]_0}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]^n} = -k \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{1-n} \cdot \left[\frac{1}{[A]^{n-1}} \right]_{[A]_0}^{[A]} = -kt$$

$$\frac{1}{[A]^{n-1}} - \frac{1}{[A]_0^{n-1}} = kt \cdot (n-1)$$

Für $t = t_{1/2}$ gilt $[A] = 1/2 [A]_0 \rightarrow$

$$\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} [A]_0^{n-1}} - \frac{1}{[A]_0^{n-1}} = kt_{1/2} \cdot (n-1)$$

Umformen nach $t_{1/2}$:

$$t_{1/2} = \frac{(2^{n-1} - 1)}{k \cdot (n-1) \cdot [A]_0^{n-1}}$$

Aufgabe 6

a)

Integrierte Zeitgesetze:

$$[A](t) = [A]_0 \cdot \exp(-k_1 t)$$

$$[B](t) = \frac{k_1 [A]_0}{k_2 - k_1} [\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)]$$

$$[C](t) = [A]_0 \left[1 - \frac{k_2}{k_2 - k_1} \exp(-k_1 t) + \frac{k_1}{k_2 - k_1} \exp(-k_2 t) \right]$$

Wendepunkt von $[C](t)$:

$$\frac{d^2[C]}{dt^2} = \frac{d}{dt} \frac{d[C]}{dt} = \frac{d}{dt} (k_2 [B]) = k_2 \frac{d[B]}{dt} = 0$$

→ $[C]$ hat beim Maximum von $[B]$ einen Wendepunkt.

b)

Am Maximum von $[B]$ gilt $\frac{d[B]}{dt} = 0$

$$\left. \frac{d[B]}{dt} \right|_{t_{\max}} = k_1 [A]_{\max} - k_2 [B]_{\max} = 0$$

$$\Rightarrow [B]_{\max} = \frac{k_1 [A]_{\max}}{k_2} = \frac{k_1}{k_2} [A]_0 \cdot \exp(-k_1 t_{\max}) \quad (*)$$

Aus dem integrierten Zeitgesetz ergibt sich für $[B]_{\max}$ außerdem:

$$[B]_{\max} = \frac{k_1}{k_2 - k_1} [A]_0 \cdot [\exp(-k_1 t_{\max}) - \exp(-k_2 t_{\max})]$$

Gleichsetzen mit (*) und umformen →

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = (k_2 - k_1) \cdot t_{\max} \quad (**)$$

(*) und (**) bilden nichtlineares Gleichungssystem, Lösung z.B. durch Iteration.

$k_2 > k_1$, verwende als Startwert z.B. $r = k_2/k_1 = 5$
 $\Rightarrow (**)$ ergibt $\Delta = k_2 - k_1 = 0,0293 \text{ s}^{-1}$
 $k_1 = \Delta/(r-1) = 0,00732 \text{ s}^{-1}$

in (*) eingesetzt:

$$r' = 3,47$$

Setze r' wieder in (**) ein, Löse nach Δ' auf usw. bis Konvergenz erreicht ist (z.B. als Excel-Tabelle)

$$\Rightarrow k_2 = 0,03 \text{ s}^{-1}, k_1 = 0,01 \text{ s}^{-1}$$

Aufgabe 7

$A \rightleftharpoons B$

$$k_1 = 1,45 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

$$\Delta_R G^0 = 1,47 \text{ kJ mol}^{-1}$$

a) Es gilt $K = \exp(-\Delta_R G^0/(RT)) = 0,5525$
 $k_{-1} = k_1/K = 2,624 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

b) $[A]_0 \neq 0, [B]_0 = 0$

$$[A](t_x) = 0,8 \cdot [A]_0$$

Integriertes Zeitgesetz:

$$[A] - [A]_\infty = ([A]_0 - [A]_\infty) \exp[-(k_1 + k_{-1})t]$$

Stoffbilanz und Gleichgewichtsbedingung:

$$[A]_\infty = \frac{[A]_0}{K + 1} = 0,644[A]_0$$

Zeit t_x bis 80% A vorliegen:

$$t_x = -\frac{1}{k_1 + k_{-1}} \ln \frac{[A] - [A]_\infty}{[A]_0 - [A]_\infty} = 2026 \text{ s} \approx 34 \text{ min}$$

Aufgabe 8

$A \triangleq$ cis-Stilben, $B \triangleq$ trans-Stilben

a) $\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_{-1}[B] \approx -k_1[A]$ zu Beginn

$$\Rightarrow \ln \frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t$$

Trage $\ln\{[A]/[A]_0\}$ gegen t auf, k_1 aus Steigung:

$$\rightarrow k_1 = 3,65 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1} = 6,09 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

k_{-1} aus Gleichgewichtsbedingung: $k_{-1} = k_1/K$, mit $K = [B]_{\infty}/[A]_{\infty} = 82,9/17,1 = 4.848$

$$\rightarrow k_{-1} = 7,54 \cdot 10^{-4} \text{ min}^{-1} = 1,26 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

b) Integriertes Zeitgesetz für reversible Reaktion:

$$[A] - [A]_{\infty} = ([A]_0 - [A]_{\infty}) \exp[-(k_1 + k_{-1})t]$$

$$\ln\left(\frac{[A] - [A]_{\infty}}{[A]_0 - [A]_{\infty}}\right) = -(k_1 + k_{-1})t$$

Trage $\ln\{([A] - [A]_{\infty})/([A]_0 - [A]_{\infty})\}$ gegen t auf, $k_1 + k_{-1}$ aus Steigung:

$$\rightarrow k_1 + k_{-1} = 4,80 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1} = 8,00 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

$$k_1 = (k_1 + k_{-1})/(1 + K^{-1}) = 3,98 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1} = 6,63 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

$$k_{-1} = 8,20 \cdot 10^{-4} \text{ min}^{-1} = 1,37 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

Abweichung bei a) jeweils ca. 8%, Geschwindigkeitskonstanten werden leicht unterschätzt.

Vergleich der beiden Ansätze:

=> Näherung in a) relativ gut.